

# ہسپتال سے منسلک بلڈ کلوٹ (خون جمنا) کے خطرے کو کم کرنا

ایک مریض کی رہنمائی



یہ کتابچہ بلڈ کلوٹنگ خون کے جمنے کی وضاحت کرتا ہے جو بیماری یا سرجری کے بعد بن سکتا ہے۔

## ہسپتال سے منسلک بلڈ کلوٹ (خون جمنے) کیا ہے؟

اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی ہسپتال میں یا گھر جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے، تو براہ کرم فوری طور پر طبی مشورہ لیں۔

ہسپتال سے منسلک بلڈ کلوٹ مریضوں کو ہوتا ہے جب وہ ہسپتال میں ہوتے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہونے کے نوے دن بعد تک رہتا ہے۔

اس کی دو قسمیں ہیں:

### 1. رگوں کی گہرائی میں انجماد خون (ڈیپ وین تھرمبوسس۔ ڈی وی ٹی)

ڈی وی ٹی ایک بلڈ کلوٹ (جو تھرمبوسس کے نام سے جانا جاتا ہے) ہے جو ایک گہری رگ میں بنتا ہے عموماً زیادہ تر ٹانگوں میں یا پیلووس میں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتیں یا پھر سوزش، سرخی اور درد ہو سکتا ہے۔

2.

### پلمونری امبولزم (پی ای)

اگر ایک بلڈ کلوٹ اپنی جگہ سے چل پڑتا ہے تو وہ آپ کی خون کی وریدوں سے گزر کر پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے پی ای کہا جاتا ہے۔ علامات میں کھانسی (بلغم میں خون کے داغ) سینے میں درد اور سانس کی تکلیف شامل ہے۔ صحت کے پیشہ ور افراد وین تھرمبوسس (وی ٹی ای) کی اصطلاح پی ای اور ڈی وی ٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

## کیا بلڈ کلوٹ عام ہیں؟

بلڈ کلوٹ ہر سال عام آبادی میں 1000 لوگوں میں سے 1 کو ہوتے ہیں۔

آپ نے ان لوگوں کو ڈی وی ٹی ہونے کے بارے میں سنا ہو گا جو ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں لیکن ہسپتال جانے کے بعد بلڈ کلوٹ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ درحقیقت تقریباً دو تہائی بلڈ کلوٹ ہسپتال میں داخلے کے دوران یا بعد میں ہوتے ہیں۔

حکومت ہسپتال سے وابستہ بلڈ کلوٹز کو ایک اہم مسئلہ تسلیم کرتی ہے اور ہسپتال کے ڈاکٹروں، نرسوں اور فارماسسٹ سے کہا گیا ہے کہ ہر مریض میں خطرے کی تشخیص کریں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر یا نرس آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو بلڈ کلوٹ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔

## کس کو خطرہ ہے؟

ہسپتال میں داخل تمام مریضوں کو ممکنہ طور پر بلڈ کلوٹ ہونے کا خطرہ ہے جب آپ ہسپتال میں داخل ہوں تو ایک ہیلتھ کیئر

پروفیشنل آپ کے خطرے کا اندازہ لگائے گا۔ اگر آپ کو خطرہ ہے تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو بلڈ کلوٹ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔

عوامل جو لوگوں کے لیے خطرہ بڑھا دیتے ہیں ان میں شامل ہیں

- سال سے زیادہ عمر کا ہونا 60
- ایک پرانا کلوٹ
- کینسر ، کینسر کا علاج یا ہارٹ فیئیر
- کینسر کی حالیہ تشخیص
- مخصوص 'چچپا خون' کی حالت جیسے اینٹی فوسفولیپڈ سینڈرم یا فیکٹر وی لیڈن
- وزن زیادہ ہونا
- غیر متحرک ہونا
  - ایسٹروجن پر مشتمل مانع حمل ادویات اور ہارمون کی تبدیلی
- آپریشن کروانا
- گہری چوٹ یا صدمہ
- حمل کے دوران اور بعد میں

میرے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟

### جرابیں

ہسپتال میں آپ کی ٹانگوں کو ماپ کر اینٹی ایمبولزم جرابیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ کو دکھایا جانا چاہئے کہ انہیں کیسے پہننا ہے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے پیروں یا ٹانگوں میں تکلیف یا کسی نئے درد کے بارے میں ہلکتہ پروفیشنل کو آگاہ کریں۔ ہر

روز ایک مختصر وقت کے لیے آپ کی جرابیں اتاری جائیں گی تا کہ ان کو دھویا جا سکے اور جلد کے مسائل کو دیکھا جا سکے۔

### ان فلیٹ ایبل بازو

طبی ٹیم آپ کو آپ کے پیروں کے گرد مخصوص ان فلیٹ ایبل سلیوز پہننے کے لیے کہہ سکتے ہیں جب آپ کرسی پر یا بستر میں بیٹھے ہوں یہ خود بخود پھول جائیں گے اور باقاعدہ وقفے سے دباؤ ڈالے گا جس سے ٹانگوں کے باہری طرف خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔

خون پتلا کرنے والی ادویات زیادہ تر مریض جو خطرے میں ہوں گے ان کو اینٹی کوگولٹ (خون پتلا کرنے والی دوا) کی چھوٹی سی خوراک تجویز کی جائے گی یہ خون کو پتلا کر کے بلڈ کلوٹ ہونے کے امکان کو کم کرتی ہے۔ ہسپتال چھوڑتے وقت اگر آپ کو ان دوائیوں کو گھر لے کر جانے کی ضرورت ہو تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ان کا استعمال کب تک کرنا ہے خون پتلا کرنے والی دواؤں میں ہیرا پن کی ایک قسم ہوتی ہے جو انجکشن کے ذریعے دی جاتی ہے۔

روک تھام کے طریقوں کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات یا خدشات ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا نرس سے بات کریں۔

عملے کو آگاہ کریں۔

• میں اپنی مدد خود کیسے کر سکتا ہوں؟

• اگر ممکن ہو تو ہسپتال آنے سے پہلے:

- اپنے ڈاکٹر سے مانع حمل یا ہارمون متبادل تھراپی کے بارے میں بات کریں۔ آپ کا ڈاکٹر آپریشن سے کئی ہفتوں پہلے اسے روکنے پر غور کر سکتا ہے اور دوسرے طریقوں کے عارضی استعمال کے بارے میں مشورہ فراہم کرے گا اگر آپ کے معمول کے مانع حمل کا استعمال روک دیا جاتا ہے۔
- وزن متوازن رکھیں۔
- باقاعدگی سے ورزش کریں۔

### جب ہسپتال میں ہوں:

- آپریشن کے بعد جتنی جلدی ہو سکے تو حرکت کریں، واک کریں اور بستر سے نکلیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنی نرس یا فزیو تھراپسٹ سے بات کریں۔
- اپنے ڈاکٹر یا نرس سے پوچھیں: 'میرے کلوٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟'
- اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھنے کے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں۔ اگر آپ کے علاج کے حصے کے طور پر پانی کا استعمال محدود نہ کیا گیا ہو۔
- اگر جرابیں پہننے سے آپ درد، تکلیف، یا لالی محسوس کریں تو وارڈ کے

جب میں گھر جاتا ہوں تو کیا ہو گا؟

جب تک آپ اپنے معمول کی سرگرمی کی سطح پر واپس نہ آجائیں آپ کو گھر جانے کے بعد بھی اینٹی ایبوزلم جرابیں پہننے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کی نرس آپ کو بتائے گی کہ انہیں کس طرح پہننا ہے اور آپ کو جلد پر کیا چیک کرنا چاہئے۔ آپ کو روزانہ انہیں ہٹا کر جلد کا معائنہ کرنا اور اسے دھونا جاری رکھنا چاہیے۔ ٹیم آپ کو مشورہ دے گی کہ آپ نے انہیں کب تک پہننا ہے۔

اگر آپ کو اینٹی کوگیولیشن انجکشن گھر پر لگانے جاری رکھنے کی ضرورت ہو گی تو نرسنگ ٹیم آپ کو سکھائے گی کہ انہیں کیسے لگانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو یقینی بنائیں کہ جانے سے پہلے آپ نرس سے اس کے بارے میں بات کریں۔

اگر آپ کو گھر پر کلوٹ بننے کی کوئی نشانی یا علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔ یا تو اپنے جنرل پریکٹیشنر (جی پی) سے یا آپ کے قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ سے

معلومات کے مفید ذرائع  
برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر یا نرس سے پوچھیں۔  
رائل پاپ ورث ہسپتال  
خون کے لوتھڑے کے بارے میں معلوماتی ویڈیو کے لیے ملاحظہ کیجیے:  
آپ کو ہسپتال میں محفوظ رکھنا

[royalpapworth.nhs.uk/inpatients](http://royalpapworth.nhs.uk/inpatients)

این ایچ ایس چوائسز -

خون کے لوتھڑے کے بارے میں مریض کی معلومات

[nhs.uk/thrombosis](http://nhs.uk/thrombosis)

(پیشنٹ ایڈوائس اینڈ لائیزن سروس) پالز

ٹرسٹ کی خدمات کے بارے میں تبصرے کرنے یا خدشات کا اظہار کرنے  
کے لیے برائے مہربانی پالز سے رابطہ کریں۔ وزیٹرز پالز سے عملے کے  
کسی رکن کے ذریعے یا بذریعہ فون رابطہ کر سکتے ہیں۔ 638896

01223

این ایچ ایس 111

صحت کی معلومات اور مشورہ پیش کرتا ہے۔ کال 111

تھرومبوسس (یو کے) چیریٹی

تھرومبوسس یو کے ایک خیراتی ادارہ ہے جو تھرومبوسس کی آگاہی، تحقیق

اور دیکھ بھال کو فروغ دیتا ہے۔ کال 0300 773 9603

وزٹ کریں: [thrombosis.org](http://thrombosis.org)



# رائل پاپ ورتھ ہسپتال این ایچ ایس فاؤنڈیشن ٹرسٹ کیمبرج یونیورسٹی ہیلتھ پارٹنرز کا رکن



پاپ ورتھ روڈ  
کیمبرج بائیو میڈیکل کیمپس  
سی بی 02 اے وائی



royalpaworth.nhs.uk



01223 638000

اس کتابچے کے بڑی پرنٹ کاپیاں اور متبادل زبانی کے ورژن  
درخواست پر دستیاب ہیں۔  
کیو آر کوڈ اسکین کر کے اس کتابچے کا ڈیجیٹل  
ورژن دیکھیں



مصنف کی شناخت: نرسنگ کے سربراہ، وی ٹی ای نرسنگ لیڈ  
شعبہ: نرسنگ  
اشاعت: اکتوبر 2023  
ورژن: اکتوبر 2025  
لیفلٹ نمبر: پی آئی 08

Translated into Urdu by Cintra

© 2023 رائل پاپ ورتھ ہسپتال این ایچ ایس فاؤنڈیشن ٹرسٹ