

سر جری والی جگہ (زخم) پر انفیکشن کی روک تھام

مریض کی رہنمائی کے لیے گائیڈ

آپ کو آپ کی ناک میں موجود بیکٹیریا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اوکٹینینس نوز جیل کی ایک ٹیوب دی جائے گی۔

رائل پاپ ورتھ ہسپتال کے مریض کی حفاظت اور بہبود سے وابستگی کے حصے کے طور پر ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کے سرجری والی جگہ (زخم) پر انفیکشن ہونے کے امکانات کو کم کریں۔

براہ کرم ڈبے کے اندر موجود معلوماتی پرچی پر درج کردہ ہدایات کے مطابق استعمال کریں سوائے اس کے کہ آپ اس میں شامل اجزا سے ہونے والی الرجی یا حساسیت سے آگاہ ہوں۔

اس کتابچے کا مقصد آپ کو اور آپ کے خاندان کو معلومات پیش کرنا ہے تا کہ آپ ان چیزوں سے آگاہ رہیں کہ آپ اور عملہ دونوں آپ کی سرجری کے بعد زخم میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے کے مدد کر سکتے ہیں۔

نوز جیل دن میں دو مرتبہ ناک کے نتھنوں میں پانچ دن تک استعمال کریں۔ سرجری کی تاریخ سے دو دن پہلے لگانا شروع کریں اور سرجری کے دو دن بعد تک اس کا استعمال جاری رکھیں۔

اس کتابچے میں لفظ بیکٹیریا عام طور پر استعمال ہونے والی اصطلاحات، جیسے کیڑے یا جراثیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

یہ ضروری ہے کہ ہر نتھنے میں ایک بار لگائیں ناک کی باہری حصے پر مساج کر کے اس منوثر استعمال کو یقینی بنائیں۔ اس نوز جیل کا ڈانقہ آپ کو منہ میں محسوس ہوگا۔

جب آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو دوران سرجری یا سرجری کے بعد سرجن کے لگائے گئے کٹ سے بیکٹیریا یا آب و ہوا آپ کے جسم میں داخل ہوسکتی ہے

اگر بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک انفیکشن ہونے کا سبب بن جاتے ہیں جسے سرجیکل سائٹ انفیکشن (زخم والی جگہ کا انفیکشن) کہتے ہیں۔

عملہ سرجیکل سائٹ انفیکشن سے بچنے کے لیے سب احتیاطی تدابیر کرے گا لیکن ان اقدامات کی پیروی کر کے خطرے کو کم کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں:

اگر آپ کو سرجری سے دو دن پہلے جیل استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر بھی اس کا استعمال پانچ دن تک جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سرجری کے دن لگانا شروع کرتے ہیں تو چار دن بعد تک لگانا جاری رکھیں۔

اوکٹینیسن ہاڈی واش کب استعمال کریں:

اوکٹینیسن ہاڈی واش:		دن-1	دن-2	دن 0	دن+1	دن+2
		سرجری سے دو دن پہلے	سرجری سے ایک دن پہلے	سرجری کا دن	سرجری کے ایک دن بعد	سرجری کے دو دن بعد
جسم		X	X	X	X	X
بال			X	X		

پر لگا کر غسل کریں۔ آپ پری ایڈمیشن کے دوران دیا گیا اوکٹینیسن ہاڈی واش کر سکتے ہیں یا وارڈ کے شاور روم / باتھ میں رکھا ہاڈی واش بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس پروڈکٹ کو بال دھونے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔

اوکٹینیسن ہاڈی واش

اوکٹینیسن ایک خاص جراثیم کش دوا ہے جو جلد پر بیکٹیریا کی تعداد کم کر کے زخم کے انفیکشن کا خطرہ کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اگر آپ کو نہانے میں مدد کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی عملے کے ممبر سے رجوع کریں۔

براہ کرم ہسپتال میں داخل ہونے سے پہلے نرس کی ہدایت کے مطابق اوکٹینیسن واش کا استعمال کریں۔

اگر آپ شاور استعمال کرنے سے قاصر ہیں تو اس پروڈکٹ کو اپنے معمول کے نہانے دھونے میں سنک یا باتھ میں ایک صابن کے طور پر استعمال کریں۔

ایک جدول کا خاکہ کہ ہاڈی واش کیسے استعمال کرنا ہے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔

1- پہلے اپنے بالوں اور جسم کو گیلا کریں۔ تقریباً تیس ملی لیٹر (دو کھانے کے چمچ) اوکٹینیسن (بغیر پانی ملائے) ایک صاف، ڈسپوز ایبل واش کلوٹھ پر لگا کر استعمال کریں اگر ہسپتال میں کر رہے ہیں اور گھر میں ایک صاف کپڑے کا استعمال کریں۔

آپ کو ہاڈی واش کا استعمال پانچ دن تک کرنا ہے۔ سرجری سے دو دن پہلے شروع کر کے سرجری کے دو دن بعد تک جاری رکھنا ہے

آپ نے سرجری سے ایک دن پہلے اور سرجری کی صبح اپنے بالوں کو دھونا ہے۔

2- اوکٹینیسن کو اپنے جسم پر گولائی میں رگڑیں، خاص طور پر اپنی بغلوں، ناف، کمر، پرینیم (مقعد اور خسیوں کے درمیان کا حصہ) اور جلد کی تہوں پر

آپ کے آپریشن سے ایک شام پہلے اور آپریشن کی صبح اوکٹینیسن واش (بغیر پانی ملائے) بہت اچھی طرح سے جسم

نچلا حصہ

خاص توجہ دیں۔

3- اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیریں گردن جسم کے تمام حصے اوکٹینسن ہاڈی واش سے اچھی طرح ڈھانپ دیں۔

4- جب بھی بالوں کو دھونے کی ضرورت ہو تو اپنے بالوں کو اوکٹینسن ہاڈی واش کے ساتھ ایک دوسرے کپڑے یا فلائین کے ساتھ استعمال کریں۔

5- یقینی بنائیں کہ اوکٹینسن آپ کی جلد (اور بالوں) پر پورے ایک منٹ کے لیے لگا رہے۔

6- صابن کی باقیات دور کرنے کے لیے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اچھی طرح سے دھو لیں۔

7- اپنی جلد کو اچھی طرح خشک کریں۔ (ذیل میں رہنمائی کے بعد)

یقینی بنائیں کہ آپ دو صاف اور خشک تولیے فی شاور استعمال کرتے ہیں۔

- ایک اوپری جسم کے لیے (کمر سے اوپر)

- ایک نچلے جسم کے لیے (کمر سے نچلا حصہ)
- ایک نچلے جسم کے لیے (کمر سے

- شاور کے بعد واش کلوٹھ کو ضائع کر دیں، فلائین اور تولیے کو دھو لیں۔

- صاف کپڑے پہنیں اور بستر کی چادریں جیسے کہ رات کا صاف لباس اور ہسپتال کا گاؤن

وارڈ کا عملہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سرجری سے پہلے آپ کے جسم کے متعلقہ حصوں سے بال تراشے جائیں۔ (براہ مہربانی خود سے ان حصوں کو شیو کرنے کی کوشش نہ کریں)۔ ممکنہ طور پر سرجری کے وقت سے جتنا قریب ہو کر ہو سکے اتنے قریب لیکن دوسرے شاور سے پہلے شیو کرنا ضروری ہے۔

ذیابیطس

ہمارے نگرانی کے اعداد و شمار سے دیکھا گیا ہے کہ ذیابیطس سے آپ کے سرجیکل سائٹ پر انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سرجری سے پہلے ایچ بی اے ون سی ٹیسٹ کروانے کے اپنے جی پی سے ملیں یہ ضروری ہے کہ آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح ٹھیک ہو تا کہ زخم کی پیچیدگیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔

جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کے خون میں گلوکوز کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی اور اگر ضرورت پڑنے پر ذیابیطس کی ماہر نرسیں آپ سے ملیں گی۔ ہسپتال سے خارج ہونے کے بعد آپ کو مسلسل نگرانی کے لیے جی پی کے پاس ریفر کیا جائے گا۔

آپریشن کے بعد

- سرجری کے بعد آپ کے زخم کی جگہ کو ڈریسنگ سے ڈھانپ دیا جائے گا تا کہ اس سے زخم بھرنے اور انفیکشن

سے حفاظت میں مدد ملے گی۔

- آپ کی دیکھ بھال میں شامل عملہ جانتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کریں گے یا اتار دیں گے۔
- براہ کرم اپنے زخم کو خود ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ آپ بیکٹیریا اپنے جسم میں داخل کرنے اور انفیکشن ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔
- آپریشن کے بعد جب محفوظ ہو گا تو نرس آپ کو شاور کرنے کا مشورہ دے گی۔ اس کے لیے آپ ایک لیکوئیڈ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں۔
- براہ کرم زخم کے مکمل صحت یاب ہونے تک اس پر کوئی لوشن، مرہم یا ٹیلکم پاؤڈر نہ لگائیں۔

سٹرنم کو سپورٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے اپنے منہ کو ڈھانپیں۔

ہم زور دیتے ہیں کہ کھانسی کے دوران آپ سیلف-ہگ تکنیک کا استعمال کریں جیسا کہ اگلے صفحے پر دکھایا گیا ہے۔ اپنے سینے کو سہارا دینے سے آپ کے سٹرنم کو صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے اور یہ سینے کا زخم کھلنے سے روکتی ہے جس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

آپ کا سرجن سکشن ڈریسنگ لگانے کا انتخاب کر سکتا ہے جو آپ کے سٹرنم میں ایک چھوٹے سے موبائل پمپ کے ذریعے چلتی ہے۔ یہ سسٹم سرجیکل سائٹ پر انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسے سرجری کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تھیراپی انسیزنل ویک کہلاتی ہے

تمام عملے کو آپ کی دیکھ بھال سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے یا ہینڈ رب استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سرجری کے بعد انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔

تمام خواتین مریضوں کو یہ ضروری نصیحت ہے کہ وہ کم از کم دو نرم برا لے کر آئیں۔ خصوصاً سرجری کے کم از کم 12 ہفتے بعد تک سونے کے لیے اور سینے کے زخم کو سہارا دینے کے لیے آگے کی طرف کھلنے والی برا کا استعمال زیادہ بہتر رہتا ہے۔

سرجری کے بعد جب کھانسی کرنے کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنے

Self-hug cough technique for post cardiothoracic surgical patients



ایک ٹشو لیں۔



اپنے موڑے ہوئے بازوؤں سے
اپنے سینے پر ہلکا سا دباؤ
ڈالتے ہوئے ٹشو پیپر میں
کھانسیں۔



ٹشو کو ریسپیٹیبل /
میں ضائع کر دیں۔



اپنے ہاتھ صاف کر لیں یا دھو لیں۔

ہم امید کرتے ہیں کہ کتابچے میں موجود
معلومات سے آپ کی تسلی ہو گئی ہو گی
اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائل
پاپ ورثہ ہسپتال میں انفیکشن کی روک
تھام اور کنٹرول کے لئے کیے جانے
والے اقدامات ہمارے مسلسل عزائم کا
حصہ ہیں۔

رائل پاپ ورثہ ہسپتال سے ڈسچارج
ہونے کے بعد اگر آپ کسی سرجیکل
انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پہلی
فرصت میں اپنے جی پی سے رابطہ
کریں۔

تاہم، براہ مہربانی سرجیکل سائٹ
سرویولنس ٹیم کو بھی اس انفیکشن سے
رابطہ کریں تاکہ ہم انفیکشن کی شرح
کی نگرانی کر سکیں اور ضرورت کے
مطابق رہنمائی کر سکیں۔

اگر آپ کے پاس مزید سوالات ہیں تو
براہ مہربانی در ذیل ٹیموں میں سے
کسی سے بھی رابطہ کرنے سے نہ
بچکچائیں۔

سرجیکل سائٹ سرویلنس ٹیم

ٹیلی فون: 01223 638033

وونڈ کنیر ٹیم

ٹیلی فون: 01223 68300

کارڈنیک سپورٹ نرس

ٹیلی فون: 01223 68300

رائل پاپ ورتھ ہسپتال این ایچ ایس فاؤنڈیشن ٹرسٹ

کیمبرج یونیورسٹی ہیلتھ پارٹنرز کا رکن



پاپ ورتھ روڈ
کیمبرج بائیو میڈیکل کیمپس
سی بی 02 اے وائی



royalpaworth.nhs.uk



01223 638000

اس کتابچے کے بڑی پرنٹ کاپیاں اور متبادل زبانی کے ورژن
درخواست پر دستیاب ہیں۔
کیو آر کوڈ اسکین کر کے اس کتابچے کا ڈیجیٹل ورژن دیکھیں۔

مصنف کی شناخت
شعبہ

ٹشو وائی ایبل اور سرجیکل سائٹ کی نگرانی کی نرس
ٹشو وائی ایبلٹی

ری پرنٹ

نومبر 2023

ریویو ڈیٹ

نومبر 2025

ورژن:

لیفٹ نمبر

5

PI 194

Translated into Urdu by Cintra



© 2023 رائل پاپ ورتھ ہسپتال این ایچ ایس فاؤنڈیشن ٹرسٹ